

KARTA PRZYPOMINAJĄCA DLA PACJENTKI STOSUJĄCEJ LEK OSAGRAND DOTYCZĄCA MARTWICY KOŚCI SZCZĘKI I (LUB) ŻUCHWY

Ta karta przypominająca zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, których należy być świadomym przed i podczas leczenia lekiem Osagrand (kwas ibandronowy).

Lekarz zalecił Pani przyjmowanie leku Osagrand, zawierającego kwas ibandronowy, który jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie. Choroba ta powoduje ścieńczenie i osłabienie kości, przez co łatwiej mogą one ulec złamaniu.

U pacjentek stosujących kwas ibandronowy z powodu osteoporozy bardzo rzadko zgłaszano występowanie działania niepożądanego zwanego martwicą kości szczęki i (lub) żuchwy (poważne uszkodzenie kości szczęki i (lub) żuchwy). Martwica kości szczęki i (lub) żuchwy może wystąpić również po zakończeniu leczenia.

Ważne jest podjęcie działań zapobiegających rozwojowi martwicy kości szczęki i (lub) żuchwy, ponieważ może być ona dolegliwością bolesną i trudną do wyleczenia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki i (lub) żuchwy, należy zastosować odpowiednie środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem leczenia:

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę (pracownika służby zdrowia) o wszelkich problemach dotyczących jamy ustnej lub zębów.

Lekarz może zalecić pacjentce zgłoszenie się na badanie stomatologiczne, jeśli pacjentka:

- była wcześniej leczona lekiem z grupy bisfosfonianów,
- przyjmuje leki zwane kortykosteroidami (np. prednizolon lub deksametazon),
- pali papierosy,
- ma rozpoznane raka,
- od dawna nie miała kontrolnych badań stomatologicznych,
- ma jakiegokolwiek problemy dotyczące jamy ustnej lub zębów.

Podczas leczenia:

- Należy utrzymywać należytą higienę jamy ustnej, regularnie myć zęby i zgłaszać się na rutynowe kontrolne badania stomatologiczne. Jeśli używane są protezy zębowe, należy zapewnić ich właściwe dopasowanie.
- W czasie leczenia stomatologicznego lub przed zabiegami stomatologicznymi (np. ekstrakcją zębów) należy poinformować o tym lekarza prowadzącego oraz powiedzieć stomatologowi, że przyjmowany jest lek zawierający kwas ibandronowy.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek dolegliwości w obrębie jamy ustnej lub zębów, takie jak obłuzowanie zębów, ból lub obrzęk, niegojące się owrzodzenia lub obecność wydzieliny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym i lekarzem stomatologiem, ponieważ mogą to być objawy martwicy kości szczęki i (lub) żuchwy.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania leku.