

Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta Avoclod (apiksaban)

Pacjent/opiekun zawsze powinien mieć tę kartę przy sobie.

Należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego przed rozpoczęciem leczenia.

Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Avoclod (apiksaban) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

ZENTIVA

Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie:

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Masa ciała:

Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

Informacja dla pacjentów/opiekunów

- Lek Avoclod należy przyjmować/podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki, należy przyjąć/podać ją od razu, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni i można ją przyjąć/podać jednocześnie z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać tylko tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/podawać dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy kontynuować dawkowanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.
- Nie należy przerywać stosowania leku Avoclod bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zakrzepu krwi lub innych powikłań.
- Avoclod pomaga w rozrzedzaniu krwi. Może to jednak zwiększyć ryzyko krwawienia.

- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień w tym zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, błądność lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**
- W przypadku konieczności zabiegu chirurgicznego lub jakiegokolwiek zabiegu inwazyjnego, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Avoclod.

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Avoclod (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Avoclod może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem Avoclod nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR)

oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) – patrz ChPL.

- Dla dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowane przeciw czynnikowi Xa, jednak nie ustalono jego bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży (patrz charakterystyka produktu leczniczego zawierającego andeksanet alfa).