

Badania krwi określające czynność wątroby

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bopaho stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. W trakcie leczenia lekiem Bopaho lekarz prowadzący zleci regularne wykonywanie badań krwi w celu kontrolowania zmian czynności wątroby.

Należy pamiętać o comiesięcznych badaniach krwi w celu określenia czynności wątroby.
Po zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.

Data pierwszego comiesięcznego badania:

5 Plan comiesięcznych badań krwi określających czynność wątroby:

Sty	Lut	Mar	Kwi
Maj	Cze	Lip	Sie
Wrz	Paź	Lis	Gru

1 Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla pacjentów przyjmujących lek Bopaho (bozentan)

Niniejsza karta zawiera ważne informacje o leku Bopaho. Należy uważnie się z nią zapoznać przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bopaho.

Imię i nazwisko pacjenta:

Lekarz przepisujący:

W przypadku pytań dotyczących leku Bopaho należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

ZENTIVA

2 Niniejszą stronę powinny uważnie przeczytać kobiety w wieku rozrodczym. Ciąża

Bopaho może negatywnie wpłynąć na rozwój płodu. Dlatego, jeśli pacjentka jest w ciąży, nie może przyjmować leku Bopaho; w trakcie leczenia produktem Bopaho nie wolno zachodzić w ciążę.

Ponadto, u pacjentki z tętniczym nadciśnieniem płucnym, ciąża może spowodować znaczne nasilenie objawów choroby. Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem ginekologiem.

Antykoncepcja

Hormonalna metoda kontroli urodzin, taka jak: doustne środki antykoncepcyjne lub pigułki antykoncepcyjne, zastrzyki hormonalne, implanty, plastry antykoncepcyjne,

nie zapobiega skutecznie ciąży u kobiet przyjmujących lek Bopaho. Należy stosować barierową metodę antykoncepcji, taką jak: prezerwatywa, wkładka wewnątrzmaciczna lub gąbka dopochwowa, dodatkowo do jakiegokolwiek z tych hormonalnych metod kontroli urodzin. Należy omówić wszelkie pytania z lekarzem prowadzącym lub lekarzem ginekologiem – wypełnić informacje po drugiej stronie tej karty i pokazać lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi ginekologowi na następnej wizycie. Pacjentka powinna wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bopaho, a następnie co miesiąc w okresie leczenia, nawet jeśli pacjentka uważa, że nie jest w ciąży.

Data pierwszego comiesięcznego testu ciążowego:

3 Antykoncepcja

Czy obecnie stosuje lub używa Pani środki antykoncepcyjne?

☐ Tak

☐ Nie

Jeśli tak, proszę podać ich nazwy:

Niniejszą kartę należy zabrać na następną wizytę u lekarza prowadzącego lub lekarza ginekologa, który będzie w stanie doradzić pacjentce, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych lub alternatywnych metod antykoncepcji.

777849/1065019249/577