

Instrukcja stosowania



- Ważne jest, żebyś Ty i/lub osoby opiekujące się Tobą wiedziały, jak prawidłowo stosować ten lek, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z ulotką dostarczoną do opakowania.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, zwróć się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne do pamiętania

- Zdejmij poprzedni plaster przed nałożeniem jednego nowego plastru.
- Stosuj tylko jeden plaster dziennie.
- Nie tnij plastra na mniejsze kawałki.
- Po nałożeniu na wybrane miejsce na skórze, plaster należy docisnąć wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak nalepiać plaster

- 1 Ostrożnie **usuń poprzedni plaster przed naklejeniem nowego**
- 2 Wyjmij nowy plaster z saszetki.
- 3 Zdejmij jedną część warstwy ochronnej plastra.
- 4 Przyłóż stronę klejącą plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usuń drugą część.
- 4 Przyciśnij plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry



Gdzie nalepiać plaster

Ostrożnie usuń poprzedni plaster przed nałożeniem nowego.

Nalep **jeden** plaster na dobę na tylko **jedno** z możliwych miejsc (jak pokazano na rysunkach).

Możesz nalepić plaster w tej samej lokalizacji (A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H), ale nie dokładnie w tym samym miejscu.

