

Instrukcja stosowania

- Ważne jest, żebyś Ty i/lub osoby opiekujące się Tobą wiedziały, jak prawidłowo stosować ten lek, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
- Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z ulotką dostarczoną do opakowania.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, zwróć się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne do pamiętania

- Zdejmij poprzedni plaster przed nalepieniem jednego nowego plastra.
- Stosuj tylko jeden plaster dziennie.
- Nie tnij plastra na mniejsze kawałki.
- Po nałożeniu na wybrane miejsce na skórze, plaster należy docisnąć wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak nalepiać plaster


1. Ostrożnie **usuń poprzedni plaster przed naklejeniem nowego**.



2. Wyjmij nowy plaster z saszetki.



3. Zdejmij jedną część warstwy ochronnej plastra.



4. Przyłóż stronę klejącą plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usuń drugą część.



5. Przyciśnij plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.



Gdzie nalepiać plaster

Ostrożnie usuń poprzedni plaster przed nalepieniem nowego.

Nalep **jeden** plaster na dobę na tylko **jedno** z możliwych miejsc (jak pokazano na rysunkach).

Możesz nalepić plaster w tej samej lokalizacji (A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H), ale nie dokładnie w tym samym miejscu.

