

NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE


UWAGA!

Lek Silcontrol przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzdrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeżeli jesteś dorosłym (≥ 18 . r.ż.) mężczyzną, a problemy ze wzdrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. **Jeżeli zaznaczysz przynajmniej jeden raz odpowiedź: TAK lub NIE WIEM, ten lek NIE jest dla Ciebie!**

Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem Silcontrol może zagrozić Twojemu życiu ?	TAK NIE WIEM	NIE
• nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitroderm, Nitromint, Minitran, Sustonit) • monoazotan izosorbidu (np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard) • diazotan izosorbidu (np. Sorbonit) • pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol compositum) • molsidominę (np. Molsidomina WZF) • nikorandyl (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma) • azotyn amylu (znany także jako „poppers”)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Czy przyjmujesz następujące leki?	TAK NIE WIEM	NIE
• sakubitril/walsartan (np. Entresto, Neparvis) • doksazosynę (np. Adadox, Cardura, Apo-Doxan, Doxar, Zoxon) • terazosynę (np. Hytrin, Kornam, Setegis) • riocyguat (Adempas) • rytonawir (np. Norvir)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Czy występują u Ciebie następujące objawy?	TAK NIE WIEM	NIE
• w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawił się ból za mostkiem w klatce piersiowej	☐	☐
• w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia	☐	☐
• zwykła , codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie	☐	☐
• często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca	☐	☐
• często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania	☐	☐
• masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	☐	☐
• masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg)	☐	☐

Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?	TAK	NIE WIEM	NIE
• w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu	☐	☐	☐
• w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała	☐	☐	☐
• masz skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub rozpoznaną chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)	☐	☐	☐
• stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające sildenafil	☐	☐	☐
• leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	☐	☐	☐
• utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkową)	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie marskość wątroby	☐	☐	☐
• wystąpiła u Ciebie nagła utrata słuchu	☐	☐	☐

Czy obecnie chorujesz na:	TAK	NIE WIEM	NIE
• chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)	☐	☐	☐
• ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)	☐	☐	☐
• białaczkę (choroba nowotworowa krwi)	☐	☐	☐
• szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	☐	☐	☐
• wirusowe zapalenie wątroby	☐	☐	☐
• nadciśnienie płucne (tj. wysokie ciśnienie krwi w płucach)	☐	☐	☐



PAMIĘTAJ!

Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzroku. Występowanie zaburzeń wzroku jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym chorób serca.

Dlatego też w trakcie okresowych wizyt zawsze poinformuj swojego lekarza o problemach ze wzrodem i o tym, że przyjmujesz lek Silcontrol.