

NARZEDZIE DIAGNOSTYCZNE

UWAGA!

Ten lek Silcontrol MAX, zawierający syldenafil, przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeżeli jesteś dorosłym (≥ 18. r.z.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współzycie płciowe. Przed zastosowaniem leku Silcontrol MAX należy skorzystać z dołączonego narzędzia diagnostycznego i odpowiedzieć na poniższe pytania. **Jeżeli zaznaczysz przynajmniej jeden raz odpowiedź: TAK lub NIE WIEM, ten lek NIE jest dla Ciebie!**

Czy kiedykolwiek lekarz powiedział Ci, że aktywność seksualna jest w Twoim przypadku niewskazana?	TAK ☐	NIE WIEM ☐	NIE ☐
Czy masz mniej niż 18 lat?	TAK ☐	NIE WIEM ☐	NIE ☐
Czy przyjmujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem Silcontrol MAX może zagrażać Twojemu życiu? nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit) monoazotan izosorbidu (np. Effox, Mononit, Olicard) pentaerytrytyl (np. Galpent, Pentaerythritol compositum) molsidominę (np. Molsidomina WZF) nikorandyl	TAK ☐ 	NIE WIEM ☐ 	NIE ☐
Czy przyjmujesz sakubitril z walsartanem (np. Entresto, Neparvis)?	TAK ☐	NIE WIEM ☐	NIE ☐
Czy przyjmujesz środki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, znany także jako „poppers”)?	TAK ☐	NIE WIEM ☐	NIE ☐
Czy przyjmujesz riociguat (np. Adempas) w leczeniu nadciśnienia płucnego?	TAK ☐	NIE WIEM ☐	NIE ☐
Czy przyjmujesz rytonawir (np. Norvir) w leczeniu zakażenia HIV?	TAK ☐	NIE WIEM ☐	NIE ☐
Czy przyjmujesz leki α-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty? doksazosynę (np. Adadox, Cardura, Apo-Doxan, Doxar, Zoxon) tamsulosynę (np. Omnic, Prostamnic, Ranlosin, Symlosin SR, Adatam, Apo-tamis, Bazetham Retard, Uprox) terazosynę (np. Hytrin, Kornam,) alfuzosynę (np. Dalfaz, Alfabax) sylodosynę (np. Urorec)	TAK ☐ 	NIE WIEM ☐ 	NIE ☐
Czy przyjmujesz antybiotyki (leki przeciwbakteryjne), takie jak: erytromycyna (np. Davercin, Erythromycinum TZF), klarytromycyna (np. Fromilid, Klabax, Klabion, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar), cyprofloksacyna (np. Ciphin, Ciprinol, Cipronex, Cipropol, Proxacin)?	TAK ☐ 	NIE WIEM ☐ 	NIE ☐
Czy przyjmujesz leki o działaniu przeciwwgrzybiczym, takie jak: itrakonazol (np. Ipozumax, Itrax, Orungal, Trioxal), ketokonazol (np. Ketokonazol, Ketoconazole HRA), pozakonazol (np. Noxafil, Ossmiq), flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Mycosyst)	TAK ☐ 	NIE WIEM ☐ 	NIE ☐
Czy występują u Ciebie następujące objawy? - w ciągu ostatnich 2 miesięcy pojawił się ból za mostkiem w klatce piersiowej - w ciągu ostatniego miesiąca zauważyłeś wyraźne pogorszenie samopoczucia zwykle, codzienna aktywność fizyczna (np. mycie się, ubieranie) powoduje duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie często odczuwasz przyspieszone lub nierówne bicie serca często miewasz zawroty głowy, wrażenie omdlewania - masz zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg) - masz zwykle wysokie ciśnienie tętnicze krwi (powyżej 150/90 mmHg)	TAK ☐ 	NIE WIEM ☐ 	NIE ☐

Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?	TAK	NIE WIEM	NIE
• w ostatnich 6 miesiącach przebyłeś zawał serca lub udar mózgu	☐	☐	☐
• w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie skrzywienie prącia, które utrudnia penetrację lub chorobę Peyroniego (stwardnienie plastyczne prącia)	☐	☐	☐
• stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające syldenafil	☐	☐	☐
• leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	☐	☐	☐
• utraciłeś wzrok w jednym oku w wyniku innej przyczyny niż uraz, zaćma lub jaskra	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwistość sierpowatokrwinkową)	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności wątroby (w tym marskość wątroby)	☐	☐	☐
• rozpoznano u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności nerek	☐	☐	☐
• wystąpiła u Ciebie nagła utrata słuchu	☐	☐	☐

Czy obecnie chorujesz na:	TAK	NIE WIEM	NIE
• chorobę wrzodową, której dolegliwości nasiliły się w ostatnim tygodniu (ból brzucha, nudności, wymioty)	☐	☐	☐
• ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)	☐	☐	☐
• białaczkę (choroba nowotworowa krwi)	☐	☐	☐
• szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	☐	☐	☐
• wirusowe zapalenie wątroby	☐	☐	☐
• nadciśnienie płucne (tj. wysokie ciśnienie krwi w płucach)	☐	☐	☐

